

FICHA TÉCNICA
Total *fix Ultra*
WDG
 Glifosato de Amonio
 Gránulo soluble

COMPOSICIÓN

GLIFOSATO DE AMONIO (Sal monoamónica de N-(fosfometil) glicina: 74.7%p/p)

REGISTRO COFEPRIS

RSCO-HEDE-0230-X0039-032-74.7

FUNCIÓN

Es un herbicida recomendado para el control de maleza y perenne. Se aplica en forma de aspersión al follaje y llega hasta las raíces de la maleza ya brotada. No tiene actividad en el suelo por lo que no daña la emergencia de los cultivos.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDAD	ESTÁNDAR
APARIENCIA	Gránulos cilíndricos uniformes
COLOR	Blanco-amarillo
SOLUBILIDAD	Dispersable en agua

USO EN CULTIVOS

CULTIVO	MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS (kg/ha)	
Limonero Lima Mandarina Naranja Pomelo Toronjo (28)	Escobilla (<i>Sida acuta</i>) Zacate pinto (<i>Echinochloa colonum</i>) Zacate burro (<i>Paspalum conjugatum</i>) Quelite o bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Caminadora (<i>Rottboellia cochinchinensis</i>)	1.0-3.0	Realizar una aplicación dirigida a la maleza; volumen de aspersión 200-300 L/ha. Para asegurar un adecuado control, adicionar un coadyuvante no iónico al 0.1%
	Hierba de pollo (<i>Commelina difusa</i>) Platanillo (<i>Heliconia bihal</i>)	3.0	

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas

(I) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Forma de abrir el envase del producto: realice el corte a la bolsa con precaución, utilizando guantes y mascarillas de protección contra polvos, evitando el contacto con la piel y los ojos. En aplicaciones terrestres mezcle la dosis de Total Fix WDG y agua varían de acuerdo con la altura y cantidad de follaje de la maleza. La cantidad de agua a usar dependerá del equipo de aplicación. Para el caso de equipo terrestre, como aspersor de mochila manual, se recomienda usar volúmenes de 200 – 300 L/ha. Se recomienda usar un coadyuvante no iónico a dosis de 0.1%. Use el equipo de protección adecuado.

CONTRAINDICACIONES

Si existe posibilidad de lluvia dentro de un periodo de 2 horas no aplique este producto ya que se reduce su efectividad. No aplique este producto en contra del viento o con vientos mayores de 10 km/hora para evitar el arrastre del producto. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable, ya que el producto puede reaccionar gas hidrógeno y formar una mezcla combustible.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta. Evite el contacto con el follaje de las plantas deseables para no causar efectos fitotóxicos. No tiene actividad en el suelo, por lo que las aplicaciones en pre siembra no afectan la germinación de la semilla del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA

No se recomienda Total Fix WDG en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.